

ČESKÉ 2014 ODRŮDY

konzumních

BRAMBOR



ČESKOMORAVSKÝ SVAZ ŠLECHTITELŮ

SKUPINA ČESKÝCH ŠLECHTITELŮ BRAMBOR

PORADENSKÝ SVAZ „BRAMBORÁŘSKÝ KROUŽEK“

MINULOST A SOUČASNOST ŠLECHTĚNÍ BRAMBORU V ČESKÉ REPUBLICE

Brambory k nám byly dovezeny v období třicetileté války v letech 1636–38 hybernskými františkány. Pěstování brambor se u nás omezovalo z počátku pouze na šlechtická sídla a klášterní zahrady, později pomáhalo lidem překonat období hladu, moru a jiných epidemií při neúrodě obilovin a to především po napoleonských válkách. V 18. století a na začátku 19. století zaznamenaly nejvýraznější rozmach brambory určené na výrobu lihu, škrobu a ke krmení. Ve světě postupně začínaly vznikat četné šlechtitelské stanice. Zejména šlechtitelé angličtí, němečtí a američtí přicházeli s novými, hodnotnějšími odrůdami. Vlastní základ šlechtění byl vyvolán katastrofálními škodami způsobenými plísní bramboru. Z obavy před ztrátou sadby se začaly brambory pěstovat ze semene. První odrůdy vznikaly nejdříve samoopylením a až později křížením dvou odrůd. Tak přišly na náš trh v druhé polovině 19. století první odrůdy světového sortimentu. První zmínka z území České republiky je o stanici „Starohraběte Františka Salm-Reifferscheida ve Valečově u Německého Brodu“. Z té doby neznámý autor popisuje šedesát tři odrůd bramboru dovezených z Ameriky, Anglie a Německa. Odrůdy již v té době byly rozděleny na brambory konzumní, průmyslové a krmné a na rané, polopozdní a pozdní. Intenzivní činnost ve všech směrech bramborářství u nás začíná po první světové válce. Postupně dochází k družstevnímu organizování pěstitelů a na jejich popud k vybudování specializované Státní výzkumné stanice zemědělské ve Valečově (v roce 1921), Státních výzkumných ústavů bramborářských v Německém Brodě (v roce 1923) a Šlechtitelské stanice v Keřkově (v roce 1923).

V současné době se novošlechtěním bramboru zabývají v České republice především SATIVA Keřkov, a.s. (SATIVA), SELEKTA Pacov, a.s. (SELEKTA), VESA Velhartice, a.s. (VESA) a částečně i Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. (VÚB). Tyto společnosti byly do roku 1990 součástí jednoho státního podniku Oseva Praha. Tvorba odrůd byla na jednotlivých pracovištích úzce specializovaná. Současná SATIVA se zabývala šlechtěním konzumních odrůd s krátkou vegetační dobou, dnešní SELEKTA především tvorbou odrůd s vysokým obsahem škrobu, VESA experimentálním šlechtěním a přípravou výchozích materiálů s vyššími odolnostmi vůči chorobám a škůdcům.

V té době nebyly odrůdy českého šlechtění vystaveny příliš silnému konkurenčnímu prostředí. Pro zajímavost v tehdejším Československu (1985) bylo registrováno 29 odrůd z toho 10 zahraničních. Šlechtění bylo zaměřeno především na odolnost odrůd vůči chorobám (plísní bramboru, aktinobakteriální obecné strupovitosti) a škůdcům (hádátka bramborovému). Velká pozornost byla věnována výběru a vývoji materiálu s plnou odolností vůči virovým chorobám, s využitím relativní odolnosti,

případně imunity, přecitlivělosti a intolerance. Nebyly povolovány odrůdy náchylné rakovině bramboru.

V první polovině devadesátých let minulého století došlo k významnému rozšíření sortimentu u nás povolených a pěstovaných odrůd. V roce 1995 bylo registrováno 72 odrůd bramboru a z toho 31 českých. V současné době mohou být u nás pěstovány odrůdy registrované v ČR (142 odrůd z toho 52 českých) a odrůdy registrované v ostatních státech EU (Společný katalog odrůd druhů zemědělských rostlin, který uvádí více jak 1 500 odrůd).

V průběhu několika let tak došlo k výraznému rozšíření nabídky o odrůdy s novými vlastnostmi. Pokrok nastal zejména v konzumní jakosti odrůd, kde jsou nyní k dispozici odrůdy všech varných typů:

Charakteristika	Varný typ				
	A	AB	B	BC	C
Konzistence	velmi pevná	pevná	středně pevná	kyprá	kyprá
Struktura	jemná až středně hrubá				jemná až hrubá
Moučnatost	velmi slabá		slabá	střední	silná
Vlhkost	střední	slabá až střední			
Nedostatky v chuti	nepatrné až střední				
Tmavnutí po uvaření	velmi slabé až středně silné				
Stabilita kvality	střední až velmi vysoká				

A, AB (BA)	<i>Charakterizuje odrůdy s velmi pevnou a pevnou dužninou, nerozvářivou, velmi slabě moučnatou, lojovitou, tj. odrůdy vhodné pro přípravu salátů a jako příloha.</i>
B, BC	<i>Patří sem odrůdy se středně pevnou až kyprou dužninou, slabě až středně moučnaté, vhodné jako příloha, do polévek a pro přípravu těst a kaší.</i>
C (CB)	<i>Odrůdy s kyprou, silně moučnatou dužninou, vhodné pro přípravu těst a kaší.</i>

K dispozici jsou odrůdy s různou délkou vegetační doby (velmi rané, rané, polorané, polopozdní a pozdní), které především pěstitelům umožňují rozložit období sklizně a nabídnout svoji produkci již od poslední dekády května a plynule zásobovat trh až do jarních měsíců příštího roku. Především užití raných konzumních brambor je v zájmu kvality omezeno stanovenou dobou sklizně (do 30. června) a proto by na trhu po 15. červenci měly být k dispozici konzumní brambory ostatní, vypěstované pro sklizeň po 1. červenci.

Šlechtitelé dále vyhověli rostoucím požadavkům na odrůdy k výrobě různých potravinářských výrobků. Lze předpokládat, že i v budoucnu bude pokračovat šlechtění zaměřené především na kvalitu konzumu a suroviny pro zpracování. Přihlédnuto bude k aktuálním požadavkům spotřebitelů.

Supermarkety požadují především odrůdy různých varných typů s hladkou, atraktivní slupkou hlíz, bez výskytu strupovitosti a dobrou reakcí na úpravu mytím. Odrůdy pro výrobce lupínků a hranolků by měly splňovat jejich požadavky na specifický obsah sušiny a barvu výrobků po smažení, možnost skladování těchto odrůd při 2–4 °C bez změny kvality výsledné produkce a s nízkým obsahem akrylamidů po smažení.

Kromě důrazu na vnitřní kvalitu hlíz budou v podmínkách naší republiky i nadále šlechtěny odrůdy s vyšší odolností k virovým chorobám. Významné místo v rezistentním šlechtění bude mít i nadále selekce na odolnost proti hádčátku bramborovému a rakovině brambor. U všech užitkových směrů pěstitelé požadují od odrůdy odolnost proti plísni bramboru a skládkovým chorobám. Produkce hlíz odrůd odolných plísni bramboru bude zárukou kvality konzumu s nízkým obsahem reziduí pesticidů a metabolitů sekundárních patogenů.

K významné změně došlo i ve vlastním procesu udržovacího šlechtění a novošlechtění bramboru. Zvládnutí techniky udržování a množení brambor v *in vitro* podmínkách umožnilo během devadesátých let minulého století přechod od klasického klonového udržování odrůd bramboru k udržování odrůd pomocí meristémového množení. Došlo tak k výraznému zefektivnění celého procesu a k bezproblémovému zajištění produkce zdravé sadby. Meristémové množení v současné době umožňuje rovněž přechod na bezvirové novošlechtění bramboru.



ČEŠTÍ ŠLECHTITELÉ BRAMBORU SE PŘEDSTAVUJÍ



Na Popelce 3187/12a, 150 00 Praha 5
 provozovna: Keřkov 72, CZ-582 22 Příbyslav
 tel.: +420 569 427 665
 e-mail: sativa@sativa.cz, www.sativa.cz


SATIVA Keřkov, a.s.

Šlechtitelská firma s dlouholetou historií zaměřená na šlechtění bramboru. Charakteristickým znakem keřkovských odrůd je jejich vysoká stolní hodnota.

DAGMAR

Varný typ **B**


Raná konzumní odrůda. Hlízy jsou oválné, slupka a dužnina žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D1) a hádátku bramborovému (Ro1).



JOLANA

Varný typ **B**

Poloraná konzumní odrůda vhodná i na zpracování. Hlízy jsou krátce oválné, středně velké, slupka a dužnina žlutá. Je odolná virovým chorobám a rakovině bramboru (D1).



JULINKA

Varný typ **B**

Raná konzumní odrůda. Hlízy jsou krátce oválné až oválné, slupka a dužnina žlutá. Je odolná hádátku bramborovému (Ro1).



KARIERAVarný typ **AB**

Poloraná konzumní odrůda. Hlízy jsou oválné, slupka a dužnina žlutá. Je odolná k rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1-4).

**KARIN**Varný typ **BA**


Raná konzumní salátová odrůda. Hlízy jsou oválné, vyrovnané tvarem i velikostí, slupka žlutá, dužnina sytě žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D 1).

**KRASA**Varný typ **B**

Velmi raná odrůda. Hlízy jsou krátce oválné, pěkného vzhledu, slupka hladká a žlutá, dužnina žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D 1), háďátku bramborovému (Ro 1).

**LADA**Varný typ **B**

Velmi raná odrůda. Hlízy jsou oválné, velké, vzhledné se žlutou slupkou a dužninou. Odolná rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1).




LILIANAVarný typ **B**


Velmi raná odrůda. Hlízy jsou krátce oválné, vzhledně se žlutou slupkou a dužninou. Odolná rakovině bramboru (D1), háďátku bramborovému (Ro1) a aktinobakteriální obecné strupovitosti.

**MARCELA**Varný typ **B**

Polopozdní až pozdní odrůda. Hlízy jsou oválné, středně velké, slupka žlutá, dužnina sytě žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D1), háďátku bramborovému (Ro1), odolná proti plísni bramboru.

**MARKETA**Varný typ **B**

Velmi raná konzumní odrůda. Hlízy jsou velké, oválné, vyrovnané, slupka a dužnina žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D1), háďátku bramborovému (Ro1), má vyšší odolnost virovým chorobám.

**RADANA**Varný typ **AB**

Velmi raná odrůda. Hlízy jsou krátce oválné až oválné, s červenou slupkou a žlutou dužninou. Má vysokou odolnost proti virovým chorobám.





Starodvorská 352, CZ-395 01 Pacov
tel.: +420 565 442 006
e-mail: selekta@iol.cz
www.sadba.cz

SELEKTA Pacov, a.s.

Šlechtí tradičně odrůdy vhodné do českého prostředí. Konzumní odrůdy jsou se žlutou a pevnější dužninou. Pacovské odrůdy mají obecně vysokou odolnost virovým chorobám, plísní bramboru a dalším faktorům, které nepříznivě ovlivňují pěstování brambor.

ADÉLA

Varný typ **BA**


Raná konzumní odrůda. Hlízy jsou oválné se sytě žlutou dužninou. Má vysokou odolnost virovým chorobám a plísní bramboru.



MADONA

Varný typ **B**

Poloraná odrůda. Hlízy jsou oválné, středně velké, slupka žlutá, dužnina světle žlutá. Je odolná proti napadení rakovinou bramboru (D 1) a hádátkem bramborovým (Ro 1).



SAMANTANA

Varný typ **BA**

Polopozdní odrůda. Hlízy jsou kulovité a kulo-vitooválné, větší, slupka žlutohnědá, dužnina světle žlutá. Je odolná hádátku bramborovému (Ro 1) a aktinobakteriální obecné strupovitosti.





VESA
Velhartice, a.s.

CZ-341 42 Kolínec
tel.: +420 376 583 322
e-mail: vesa@velhartice.cz
www.vesa-velhartice.cz


VESA Velhartice, a.s.

Šlechtitelská stanice vznikla v roce 1957. Zabývá se tvorbou nových kvalitních odrůd bramboru všech ranostních skupin a všech užitkových směrů, množením sadby brambor, obchodem se sadbovými, konzumními a průmyslovými bramborami a v neposlední řadě poradenstvím pro pěstitele a uživatele brambor.

ALICE

Varný typ **B**

Raná odrůda určená pro přímý letní, podzimní a zimní přímý konzum. Vyniká velmi vysokým výnosem krátce oválných, velkých, vzhledných hlíz se žlutou slupkou a žlutou dužninou. Vhodná pro mytí, balení i loupání. Odolnost virovým chorobám je velmi vysoká, hlízy jsou dobře odolné mechanickému poškození a aktinobakteriální obecné strupovitosti. Odrůda je odolná rakovině bramboru (D1) a hádátku bramborovému (Ro1).



BARBORA

Varný typ **B**

Raná konzumní odrůda s dobrou skladovatelností. Hlízy jsou krátce oválné až oválné, se sytě žlutou dužninou a žlutou slupkou, slupka je hladká, jemná. Odolnost virovým chorobám je vyšší, je odolná rakovině bramboru (D1) a hádátku bramborovému (Ro1).



BELLA

Varný typ **B-BA**

Poloraná konzumní odrůda určená k přímému konzumu i ke zpracování na hranolky. Hlízy jsou dlouze oválné, vzhledné, s hladkou červenou slupkou a sytě žlutou dužninou. Je odolná vůči aktinobakteriální obecné strupovitosti, hádátku bramborovému (Ro1) a vysoce odolná virovým chorobám, zejména S viru bramboru a dobře odolná proti plísni bramboru v nati.



BOHEMIAVarný typ **BA**

Raná až poloraná odrůda. Hlízy jsou oválné se žlutou, hladkou slupkou a sytě žlutou dužninou. Odolná mechanickému poškození, aktinobakteriální obecné strupovitosti a skládkovým chorobám.

**DICOLORA**Varný typ **AB**

Raná odrůda určená pro rané sklizně v rano-bramborářské a bramborářské oblasti. Hlízy jsou oválné s dvoubarevnou slupkou s ostře ohraničenými červenými skvrnami a žlutou dužninou. Odolnost mechanickému poškození je velmi dobrá, virovým chorobám střední. Odrůda je odolná rakovině bramboru (D 1).

**JANET**Varný typ **B**

Poloraná konzumní odrůda určená pro podzimní a zimní přímý konzum. Hlízy jsou oválné, středně velké, slupka a dužnina žlutá. Je odolná vůči háďátku bramborovému (Ro 1).

**JITKA**Varný typ **B-BC**

Konzumní odrůda určená pro podzimní a zimní přímý konzum. Hlízy jsou krátce oválné, slupka žlutá, dužnina sytě žlutá. Odolnost virovým chorobám je velmi vysoká.



LYDIAVarný typ **B**

Polopozdní odrůda. Hlízy jsou krátce oválné se žlutou slupkou a sytě žlutou dužninou. Vysoce odolná mechanickému poškození, aktinobakteriální obecné strupovitosti a skládkovým chorobám.

**MAGDA**Varný typ **B**

Velmi raná odrůda určená pro první termíny sklizně v ranobramborářské oblasti. Hlízy jsou krátce oválné, vzhledné, se žlutou slupkou a středně žlutou dužninou. Je odolná rakovině bramboru a aktinobakteriální obecné strupovitosti.

**MARIANNKA**Varný typ **BA**

Odrůda určená pro velmi rané a rané sklizně. Hlízy jsou krátce oválné, velmi vzhledné se sytě žlutou dužninou a žlutou slupkou. Dužnina hlíz se vyznačuje pevnou konzistencí a vynikající stabilitou barvy za syrova i po uvaření. Odolnost obecné strupovitosti i virovým chorobám je dobrá. Je odolná k rakovině bramboru (D1) a háďátku bramborovému (Ro 1).

**MONIKA**Varný typ **B**

Odrůda určená pro velmi rané sklizně. Hlízy jsou dlouze oválné, velmi vzhledné se žlutou dužninou a slupkou, která je hladká, jemná. Odolnost aktinobakteriální obecné strupovitosti je velmi dobrá, velmi dobrá je i odolnost k virovým chorobám. Je odolná vůči háďátku bramborovému (Ro 1) a plísni bramboru.



NANCYVarný typ **BA**

Poloraná odrůda. Hlízy jsou oválné až dlouze oválné, vzhledně se sytě žlutou dužninou i slupkou, slupka je hladká, jemná. Odolnost virovým chorobám je vyšší, k rakovině bramboru (D 1) a hádátku bramborovému (Ro 1) je odolná.

**PRIMAROSA**Varný typ **A-B**


Velmi raná až raná odrůda určená pro letní sklizně v ranobramborářské a bramborářské oblasti. Vyznačuje se velmi vysokým výnosem tržních hlíz v nejranějších termínech sklizně. Hlízy jsou oválné, velké s červenou slupkou a žlutou dužninou. Odolnost virovým chorobám, aktinobakteriální obecné strupovitosti a mechanickému poškození hlíz je vyšší. Odrůda je odolná rakovině bramboru (D 1) a hádátku bramborovému (Ro 1 a Pa 1).

**RED ANNA**Varný typ **B-BA**

Poloraná konzumní odrůda. Hlízy jsou oválné, slupka červená, hladká až jemně sítkovaná, barva dužniny sytě žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D 1) a hádátku bramborovému (Ro 1), odolnost virovým chorobám je velmi vysoká.


**SUZAN**Varný typ **B-BA**

Velmi raná odrůda určená pro velmi rané sklizně v ranobramborářské oblasti. Hlízy jsou oválné až dlouze oválné se žlutou slupkou a dužninou. Odolná rakovině bramboru (D 1) a hádátku bramborovému (Ro 1), středně odolná virovým chorobám s velmi dobrou odolností k aktinobakteriální obecné strupovitosti.




TERKAVarný typ **B**

Raná až poloraná odrůda. Hlízy jsou krátce oválné se žlutou slupkou a dužninou. Vyznačuje se vysokou odolností proti virovým chorobám, odolností proti rakovině bramboru (D 1), háďátku bramborovému (Ro 1) a aktinobakteriální obecné strupovitosti.

**VENDULA**Varný typ **BA**

Raná až poloraná konzumní odrůda. Hlízy jsou dlouze oválné, vzhledné, s hladkou žlutou slupkou a sytě žlutou dužninou. Je odolná k rakovině bramboru (D 1) a háďátku bramborovému (Ro 1) a vysoce odolná k virovým chorobám, zejména Y viru bramboru. Odolnost plísni bramboru v nati a aktinobakteriální obecné strupovitosti a hnědé skvrnitosti je vysoká.

**VLASTA**Varný typ **B**

Poloraná konzumní odrůda. Hlízy jsou krátce oválné, středně velké až větší, vyrovnané se žlutou dužninou. Je odolná háďátku bramborovému (Ro 1), rakovině bramboru (D 1), virovým chorobám, aktinobakteriální obecné strupovitosti a plísni bramboru v nati i na hlízách.





**VÝZKUMNÝ ÚSTAV
BRAMBORÁŘSKÝ**
Havlíčkův Brod, s. r. o.

Dobrovského 2366
CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 213
e-mail: vubhb@vubhb.cz, www.vubhb.cz

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.

Není přímo specializovaným šlechtitelským pracovištěm. Ve spolupráci se šlechtitelskými společnostmi se v rámci společných výzkumných projektů zabývá především tvorbou nových genových zdrojů využitelných pro šlechtění, zejména s ohledem na odolnost k plísní bramboru a dále pak na vnitřní kvalitu a jakost hlíz. Ústav v posledních letech přispěl k znovuzavedení odrůdy Keřkovské rohlíčky a k vyšlechtění odrůd Valfi, Axa a Valy.

AXA

Varný typ **AB**


Raná odrůda (vyšlechtěna Vysočinou Vyklantice, a. s., ve spolupráci s VÚB). Vzhledné hlízy jsou oválného tvaru s červenostrakatou slupkou červeně zbarvenou v okolí oček. Je odolná virovým chorobám a plísní bramboru na hlíze, háďátku bramborovému (Ro 1) a rakovině bramboru (D 1), má vyšší odolnost k aktinobakteriální obecné strupovitosti bramboru.



KEŘKOVSKÉ ROHLÍČKY

Varný typ **BA-B**

Poloraná konzumní odrůda (vyšlechtěná v roce 1940 na Šlechtitelské stanici Keřkov) vhodná pro přípravu salátů. Hlízy jsou velmi dlouhé, rohlíčkovité, slupka žlutá, dužnina světle žlutá. Je odolná rakovině bramboru (D 1).



VALFI


Varný typ **BC**

Speciální poloraná až polopozdní konzumní odrůda s modrofialovou slupkou a modrofialovou mramorovanou dužninou. Hlízy jsou oválné, středně velké až velké. Je středně až méně odolná aktinobakteriální obecné strupovitosti.



VALYVarný typ **BC**

Raná konzumní odrůda. Hlízy jsou oválné, středně velké, se světle žlutou dužninou a žlutou slupkou, v okolí mělkých oček červeně zbarvenou. Je odolná hádátku bramborovému (Ro1), mechanickému poškození a středně odolná aktinobakteriální obecné strupovitosti.

**ČEHO SI VŠÍMAT PŘI KOUPI BRAMBOR****PRO SADBVOVÉ ÚČELY**

Kvalita sadby (výkonnost, vitalita, zdravotní stav) rozhodujícím způsobem ovlivňuje úspěšnost pěstování brambor. Nadměrná „šetrnost“ při nákupu sadby se vesměs nevyplácí, a proto je nutné k výsadbě používat nejlépe certifikovanou sadbu, tj. sadbu uznanou při polních přehlídkách a posklizňových zkouškách. Certifikovaná sadba zaručuje odpovídající zdravotní stav deklarované odrůdy a při dodržení základních pěstitelských opatření i výnos kvalitních hlíz.

Před nákupem sadby konzumních odrůd je užitečné zvážit požadovanou délku vegetační doby zvolené odrůdy a případně využít zkušenosti, či informace o konkrétních odrůdách pro jejich výběr. Velmi výhodný je nákup sadby u osvědčených dodavatelů. Shrňme-li pak doporučení při koupi sadbových brambor:

- dáváme přednost certifikované sadbě,
- odrůdu vybíráme s ohledem na délku vegetační doby, varný typ a ostatní vlastnosti (odolnost k plísní bramboru, aktinobakteriální obecné strupovitosti apod.),
- nakupujeme pouze nezbytně potřebné množství sadby (šetříme na množství, nešetříme na kvalitě),
- vyžadujeme, aby i malé balení sadby bylo řádně označeno (odrůda, množitelství stupeň, dodavatel, číslo partie, hmotnost).

PRO KONZUMNÍ ÚČELY

Hlízy by měly být nepoškozené, čisté, zdravé a suché, měly by být pevné a mít lehkou zemitou vůni a stejnou barvu. Bez ohledu na to, jedná-li se o prodej volných nebo balených brambor po určitém množství, nesmí u nich chybět následující údaje (vyhláška MZe č. 157/2003 Sb. ve znění pozdějších právních předpisů):

- obchodní označení názvem skupiny (konzumní rané, konzumní pozdní),
- název odrůdy,
- varný typ (u skupiny konzumní pozdní),
- u zabaleného zboží hmotnost v kilogramech,
- země původu (u dovozů),
- adresa obchodní firmy, ze které musí být zřejmé, jedná-li se o výrobce, dovozce nebo prodejce,
- barva dužniny a tvar hlíz (u skupiny konzumní rané),
- případně označení „drobné“ (u skupiny konzumní rané).

Odrůdy, které se u nás pěstují, jsou kvalitní. Ke zhoršení stolní hodnoty a zejména chuti hlíz může dojít při pěstování, ale především v průběhu manipulace, skladování, tržní úpravy a prodeje hlíz. K nejzávažnějším chybám patří především nedodržování základních pěstitelských zásad (hnojení, ochrana proti škodlivým činitelům), mechanické poškozování hlíz při sklizni a posklizňové úpravě doprovázené napadením hlíz skládkovými chorobami, nevhodný skladovací režim, nešetrná tržní úprava a necitlivá manipulace v obchodní síti. Úroveň prodeje se v posledních letech postupně zlepšuje. Samozřejmě se stává prodej mytých hlíz, řádně zabalených a označených. Naši spotřebitelé ustupují od zimního předzásobení, více nakupují v drobném balení, výrobky i polotovary z brambor.

Výhodné je nakupovat brambory v drobném, myté a řádně označené. Vybírat podle varného typu (odrůdy) a dávat přednost české produkci (u dovážených se jedná velmi často o méně kvalitní hlízy, které jako nadprodukce nenašly uplatnění v zemi vývozce). Větší množství pro zimní skladování je možné zakoupit, ale pouze od osvědčeného, resp. známého pěstitele se zárukou kvality a minimálních ztrát. Bohužel ani prodej nebalených brambor ve stáncích a v některých obchodech není bez rizika. Vesměs zde chybí pravdivé údaje o odrůdě a nabízené zboží neodpovídá kvalitou. K zlepšení situace může přispět i sám spotřebitel tím, že bude vyžadovat, aby zboží bylo kvalitní, a upozorní na zjevné nedostatky.

Přípustný výskyt vad u konzumních brambor upravuje vyhláška č. 291/2010 Sb. I proto je výhodné nakupovat myté hlízy, které je však nutné bezprostředně spotřebovat. Při nákupu nemytých hlíz je potřebná pečlivější kontrola kvality, protože řada nedostatků může být skryta pod zbytky ulpělé zeminy. Proto by v tomto případě měla být pro obchod samozřejmě nabídkou hlíz po jejich mechanickém očištění.

Při nákupu „ze dvora“ je nejlepší, když opakovaně využíváme nabídku od osvědčeného pěstitele.

PŘÍPUSTNÝ VÝSKYT VAD U KONZUMNÍCH BRAMBOR

<i>Ukazatel</i>	<i>Brambory konzumní rané celkem nejvýše do 4 % hmotnosti</i>	<i>Brambory konzumní pozdní celkem nejvýše do 6 % hmotnosti</i>
Nárůstky, fyziologické rozprasky, pořezání, omrzliny, otlaky, požerky	nad 3,5 mm	nad 5 mm
Čerstvé praskliny	nad 3,5 mm	
Zhojené praskliny	–	nad 5 mm
Skvrny pod slupkou	–	nad 5 mm
Deformace	těžké	
Zavadlé hlízy	jakékoliv	
Rzivost, dutost a jiné vnitřní vady	jakékoliv	
Naklíčené hlízy	–	delší než 3 mm
Hnědé skvrny způsobené sluncem	jakékoli	–
Obecná strupovitost povrchová	nad 1/4 povrchu, ale do 1 % v rámci 4% tolerance	nad 1/4 povrchu
Zelené hlízy	více než 1/8 povrchu, nebo po oloupání u 1 % hlíz v rámci 4% tolerance	více než 1/8 povrchu, nebo více než 1 vrstva loupání
Suchá hniloba a měkká hniloba	max. 1 % v rámci 4% tolerance	max. 1 % v rámci 6% tolerance
Plíseň bramboru	max. 1 % v rámci 4% tolerance	max. 1 % v rámci 6% tolerance
Mechanické příměsi (nalepená a volná zemina, cizí tělesa)	do 1 % hmotnosti	do 2 % hmotnosti (z toho max. 1 % zeminy nalepené na hlízách)
Jiná odrůda nebo odrůdy, než je deklarováno	do 2 % hmotnosti	
Karanténní choroby	nepovoluje se	

PODĚKOVÁNÍ

- Šlechtitelským společnostem, které poskytly informace zveřejněné v této publikaci.
- MZe ČR za podporu projektů:
 - QF 4133 Tvorba výchozích šlechtitelských materiálů s geny horizontální rezistence k plísni bramboru, který přispěl k tvorbě výchozích materiálů pro praktické šlechtění odrůd bramboru,
 - 1B53036 Novošlechtění bramboru na bezvirovém základě, který přispěl k vytvoření pružného a efektivního systému bezvirového šlechtění bramboru.
- MZe ČR za podporu dotačních titulů:
 - Podpora tvorby rostlinných genotypů s vysokou rezistencí k biotickým i abiotickým faktorům a diferencovanou kvalitou obilovin včetně kukuřice, malých zrnin, olejin, luskovin, brambor, píce, zelenin, chmele, révy vinné a ovocných dřevin, který přispívá k tvorbě výchozích šlechtitelských materiálů,
 - Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin, zvířat a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství, který přispívá i v oblasti bramboru k uchování a využívání biodiversity této plodiny s důrazem na zachování a umožnění následného využití českých odrůd a významných materiálů vzniklých jak v procesu novošlechtění bramboru, tak v rámci výzkumných projektů.
- Českomoravské šlechtitelské a semenářské asociaci za hájení práv a zájmů svých členů i celého oboru, zastupování oboru v jednání s ústředními institucemi, za zpracovávání a tvorbu odborných stanovisek k návrhům legislativních i odborných norem.
- V neposlední řadě všem spolupracovníkům, za jejich námahou, neúnavnou a pečlivou práci, bez které by tvorba českých odrůd nebyla možná.



KONTAKTY NA ŠLECHTITELSKÁ PRACOVIŠTĚ

Sativa Keřkov, a. s.

Na Popelce 3187/12a, 150 00 Praha 5
provozovna Keřkov 72, CZ-582 22 Přibyslav
tel.: +420 569 427 665, e-mail: sativa@sativa.cz
www.sativa.cz

Selekta Pacov, a. s.

Starodvorská 352, CZ-395 01 Pacov
tel.: +420 565 442 006, e-mail: selekta@iol.cz
www.sadba.cz

Vesa Velhartice, a. s.

CZ-341 42 Kolinec
tel.: +420 376 583 322, e-mail: sedlacek@vesa-velhartice.cz
www.vesa-velhartice.cz

pracoviště Česká Bělá:

Vesa Česká Bělá, a. s.

CZ-582 61 Česká Bělá 308
tel.: +420 569 444 801

Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s. r. o.

Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 213, e-mail: vubhb@vubhb.cz
www.vubhb.cz



Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“

Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod
tel.: +420 569 466 215, e-mail: exnarova@vubhb.cz

Vydal Českomoravský svaz šlechtitelů, Přízová 8-10, Brno
a Poradenský svaz „Bramborářský kroužek“,
Dobrovského 2366, CZ-580 01 Havlíčkův Brod.

Náklad 3000 výtisků.

Grafická úprava Jiří Trachtulec.